

## ROM

تقيس الحرارة و تعطي المريضة 2gm ampicillin

وتطلع علي كرسي او ترولي / العيانة دي ماتمشيش

2 patients not to walk: ROM, placenta previa


Management

### Before 24: 2<sup>nd</sup> trimester abortion

R Misotac قرصين من فوق و قرصين من تحت

Cervical ripening

- هدخل قسطرة و قفلها ب 50 سم ملح
- و ادخل من الناحية الثانية 10 سم ملح مدوب فيهم قرص Misotac



- اول ما ال Cervix يفتح ادي 500/10
- اول مالعيل ينزل ادي 500/20
- اول م ال placenta تنزل ادي 500/22

هنا في القسم بيبدنوا conserve من 24 اسبوع

**24-37 Weeks:** انا مع العيل مادامت الام كويسه

Fetus Prematurity

R Dexamethasone/6h

R Konakion /12 H

For infection: most common pathogen is group B-hemolytic streptococci

R Ampicillin 1gm /6h for 1 week

R Erythromycin 500mg /6h for 2 weeks

## Regular Check up

- » US → AFI
- » For infection:
  - Temperature: Fever  $>37^{\circ}\text{C}$
  - FHR: Fetal/ maternal tachycardia
  - ESR, CRP

## If more than 37 weeks

Cervix أشوف

- » Favorable → SVD
- » Not favorable
  - Primigravida → C. Section
  - *Misotac* → ربيع قرص → لسة مبيفتحش → C. Section

**If oligohydramnios → C. Section**